

KAPUSTA PEKIŃSKA

(*Brassica pekinensis*)

Kapusta pekińska – Roślina długiego dnia o krótkim okresie wegetacji. Główki wiążą się w okresie wiosennym i jesiennym podczas krótkich dni, w temp. 16-21°C. Oznaczają się one dużą wartością odżywczą. Zawierają: białko, cukry, sole mineralne (wapń, fosfor, żelazo) oraz witaminę C i A. Mogą być spożywane na surowo, gotowane i kwaszone. Dobrze przechowują się do grudnia. Najlepiej udaje się na glebach żyznych, próchnicznych, wilgotnych, obficie nawożonych i dobrze zdrenowanych. Stanowisko słoneczne, osłonięte od wiatru. Uprawiamy ją w pierwszym roku po oborniku jako poplon. Nasiona wysiewamy w szklarni do doniczek lub wprost do gruntu, w ilości 1-2g/10m². Głębokość siewu 1-2 cm. Zbyt gęste wschody przerywamy. Rośliny w końcowej fazie wzrostu znoszą przymrozki do -2°C. Zabiegi pielęgnacyjne: nawadnianie, odchwaszczanie i nawożenie nawozami mineralnymi łatwo przyswajalnymi. Ilość nasion w 1g: 330-400 szt.

SIEW : 10-20.II, 10-30.VII

PIKOWANIE: kon.II-pocz.III

ROZSADA: Kon.III-pocz.IV

ZBIÓR : X-XI

NAWOŻENIE na 1ar: 1,5kg N, 1,15kg P₂O₅, 2,6kg K₂O, 1,2kg Mg, obornik

ROZSTAWA : 15-40 x 30-50 cm.

CHOROBY: kiła kapuściana, zgorzel siewek kapusty, mączniak rzekomy kapusty, czarna plamistość, szara pleśń, zgnilizna twardzikowa, „tipburn” (choroba fizjologiczna objawiająca się zamieraniem liści wewnątrz główki w wyniku niedoboru wody w glebie)

SZKODNIKI : pchełki ziemne, śmietka kapuściana, mszyca kapuściana, bielonek kapustnik, piętnówka kapustnica, tatniś krzyżowiaczek